

NOTAS PARA LA FLORA DE JAEN IV: LILIALES

M.A. ESPINOSA JIMÉNEZ *

C. FERNÁNDEZ LÓPEZ *

Key words: Chorology, vascular plants, Jaén, (SE. Spain) *Liliales*, Monocotiledons.

RESUMEN.— Se comentan un total de 16 especies y subespecies de *Liliales* (*Monocotiledonae*) procedentes de la provincia de Jaén (sureste de la Península Ibérica). De ellas 8 son nuevas para la flora de Jaén y otras son poco conocidas.

SUMMARY.— An amount of 16 species and subspecies of *Liliales* (*Monocotiledons*) from the Jaén province (S.E. Iberian peninsula). Of then 8 are new for the flora of Jaén and others are scarcely recorded.

Como otra parte, ESPINOSA & FERNÁNDEZ (*Blancoana* 3: 14-34, 1985; *Blancoana* 4: 49-54, 1986) de la revisión de más de 1.300 pliegos de plantas, la mayoría depositadas en el herbario JAEN (Colegio Univ. «Santo Reino». Jaén), hemos reunido aquí una serie de comentarios a especies poco conocidas en la flora de la provincia de Jaén.

Mientras no se indique otra cosa el recolector de los pliegues es Carlos Fernández y el uso del U.T.M. que acompaña la localidad es 30S.

***Colchicum triphyllum* G. Kunze**

Nuestros testimonios parecen los primeros en la provincia. Crece en herbazales de lugares rocosos calizos.

Santiago de la Espada, (WH 10), *Cobos* 8-IV-1984 (JAEN: 84-362); Cazorra. Nava del Empanadas, (WG 19), *Cobos* 18-II-1984 (JAEN: 84-325); Sierra Mágina, Martín Gil IV-1974 (JAEN: 74-2005); Jaén. Jabalcuz (VG 27), 6-III-1973 (JAEN: 73-159).

***Colchicum bivonae* Guss.**

Citado por GALIANO & HEYWOOD (*Catálogo de plantas de la provincia de Jaén (Mitad oriental)*, 1960) y FERNÁNDEZ *Flora y vegetación del SW de la provincia*

* Colegio Universitario «Santo Reino». 23071 Jaén (España).

de Jaén. Tesis Doctorales de la Univ. Granada. 1979: 177). Creemos que se puede dudar de su presencia en Jaén pues los pliegues citados no corresponden a esta especie: Puerta de Segura, BORJA, GALIANO & RIVAS (SEV: 5785); Jaén. Jabalcuz, 6-III-1973 (JAEN: 73-156).

Gagea nevadensis Boiss.

Nuestras indicaciones parecen las primeras en la provincia. Crecía sobre margocalizas y calizas en lugares secos y herbosos al principio de la primavera.

Pegalajar. Serrezuela (VG 47), ESPINOSA 8-IV-1984 (JAEN: 84-416); Jódar, hacia Quesada Km. 6 (VG 78), 8-III-1979 (JAEN: 79-127); Mancha Real. Mojón Blanco, (VG 57), MORAL y otros 26-III-1984 (JAEN: 84-356); Jaén. Jabalcuz (VG 27), 6-III-1973 (JAEN: 73-158).

Gagea foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil.

A pesar de haber sido indicada por varios autores en la provincia: CUATRECASAS (*Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona* 12: 3-510 —1929—); GALIANO & HEYWOOD (*l.c.*, 1960: 38) y FERNÁNDEZ (*l.c.*, 1979: 178; Fuentes para la Flora de Jaén. *Cooperativa Farmacéutica*, 1983: 98) después de revisar los pliegues señalados como tal pensamos que todas las citas deben referirse a *Gagea polymorpha* Boiss., que es la especie del género más frecuente y abundante. Por ello pensamos que puede dejar de incluirse en la flora giennense.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Las citas provinciales anteriores de CUATRECASAS (*l.c.*, 1929: 249) y FERNÁNDEZ (*l.c.*, 1979: 178); no corresponden a esta especie. La siguiente pensamos que es la primera referencia en la provincia. Crecía en un herbazal umbrío de un lugar abierto, entre jaras, sobre terreno silíceo.

Bailén, Zocueca (VH 21), 280 m 3-VI-1984 (JAEN: 84-1252).

Ornithogalum collinum Guss.

Los pliegues de Mágina, Despeñaperros y suroeste provincial (CUATRECASAS; *l.c.*, 1929: 248; FERNÁNDEZ, *l.c.*, 1979: 178), no corresponden a esta especie.

Las indicaciones de GALIANO & HEYWOOD (*l.c.*, 1960: 38) en Cazorla y Segura, se apoyan en: Sierra de Segura, Galiano (SEV: 5832, n.v.). Por tanto su presencia en Jaén necesitaría confirmación.

Scilla ramburei Boiss.

Nuestra cita parece la primera en la provincia. Podría estar más extendida en Sierra Morena, pero ésta ha sido poco recorrida al principio de la primavera (FERNÁNDEZ, *Blancoana* 3: 99-103, 1985).

Andújar. Carretera desde Virgen de la Cabeza a Ciudad Real (VH 03), Cano 26-IV-1984 (JAEN: 84-3737 y 84-3738).

Hyacinthoides italica (L.) Rothm.

La única cita provincial en la Sierra de Segura (FERNÁNDEZ, *l.c.* 1983: 99), basada en un pliego de MA. corresponde a *Scilla reverchonii* Degen & Hervier, y por ello puede desecharse de la flora giennense.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.

Nuestros pliegos parecen los primeros provinciales. Crece tanto en terreno calizo como silíceo:

Marmolejo. Arroyo Bahoncillo (UH 91), CANO 1-V-1984 (JAEN: 84-3740). Ciudad Real. Arroyo Constanza (VH 04), CANO 26-IV-1984 (JAEN: 84-4086); La Iruela. De Valdeazores al Cantalar, (WH 10), GARCÍA-ABASOLO 12-IV-1981 (JAEN: 81-327); Martos. Sierra Caracolera (VG 16), 19-VI-1981 (JAEN: 81-1935).

Muscari marianica Pau

En contra de lo indicado en RIVAS & BELLOT (*l.c.*, 1946: 179) que probablemente fue recogido por DAVIS & STUART (*Fl. Europaea* 5: 46-49, 428 (1980), este binomen debe ser considerado como sinónimo de *Muscari neglectum* Guss ex Ten. (Despeñaperros, Cuatrecasas, MAF: 34496).

Esta misma sinonimia debe considerarse para ejemplares examinados de *Muscari giennense* Pau et Cuatrecasas in Cuatrecasas (Sierra Mágina, *Cuatrecasas* MAF: 34496).

Narcissus rupicola Dufour in Schultes & Schultes fil.

La única referencia provincial (FERNÁNDEZ, *l.c.* 1983: 100) está basada en el siguiente pliego. Puede tratarse de una de las referencias más al sur de la península pues su área normal de distribución es el centro de España sobre terreno silíceo: Despeñaperros. FUERTES LASALA 21-III-1976 (MAF: 95255).

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. **major** (Curtis) Baker

La única indicación provincial (FERNÁNDEZ, *l.c.*, 1983: 101) se basa en un pliego que no corresponde a esta especie. Las localidades siguientes pueden ser las primeras para la provincia:

Torredelcampo. Jabalcuz, *Blanca* 7-IV-1974 (GDAC: 200); Idem., Cuestanegra (VG 27), *Blanca* (GDAC: 12698).

Iris lutescens Lam. subsp. **subbiflora** Brot.

La única referencia de la especie en la provincia (CUATRECASAS, *l.c.*, 1929: 252) se refiere a *Iris chamaeris* Bertol, que según *Flora Europaea* (1980: 90) aparece en el NE. de España y por ello pensamos que se puede desechar de la flora de Jaén.

Indicamos los pliegos de la subespecie señalada más arriba que son los primeros para la provincia:

Sierra Mágina, *Cuatrecasas* (MAF: 29832, n.v.); Torres. Cerro Saladillo (VG 57), *Pulido* y otros 11-V-1984 (JAEN: 84-2255); Jaén a Mancha Real (VG 47), *García-Abasolo* 27-V-1981 (Jaen: 80-1240); Jaén. La Mella (VG 27), 23-VI-1983 (JAEN: 83-2261).

Gladiolus communis L. subsp. **byzantinus** (Miller) A.P. Hamilton.

Los pliegos siguientes parecen los primeros para este taxón que es raro en la provincia de Jaén:

Andújar. Desembocadura del Jándula (VH 01), *Cano* 6-V-1984 (JAEN: 84-3943); Carchelejo, *Guinea* 20-VI-1941 (JAEN: Guinea 18-80).

AGRADECIMIENTOS.— A Alfredo Barra y Javier Fernández Casas (Madrid) que determinaron los ejemplares de *Narcissus* L. hasta 1983.

A Julio Pastor (Sevilla) que confirmó nuestras determinaciones de *Ornithogalum*.

Y al personal de los herbarios, GDA, GDAC, MA, MAF y SEV que nos facilitaron el estudio de su material.

(Aceptado para su publicación el 10-1-1986)