

NOTAS DE DISTRIBUCIÓN

TRITURUS BOSCAI (TRITÓN IBÉRICO) EN LA SIERRA DE CAZORLA (PROVINCIA DE JAÉN)

El 25 de marzo de 1997 fueron hallados un grupo de 20 ejemplares juveniles de *Triturus boscai* en un charco temporal en el collado del Camino de los Leñadores con el valle del arroyo Gualay (Sierra de Cazorla, Prov. Jaén; 37° 54' N, 2° 57' W; UTM 30S WG0495) a una altitud de 1600 m. Los ejemplares presentaban aún branquias y corrían riesgo de desecación debido a las altas temperaturas y ausencia de lluvias, ya que el charco donde se encontraban había reducido su tamaño considerablemente a unos 30 cm de diámetro y 5 cm de profundidad. Los ejemplares fueron capturados y depositados en un pequeño arroyo cercano. El hábitat estaba constituido por un bosque supramediterráneo de *Pinus nigra*, *Juniperus* sp. y matorral.

La presente supone la cita más oriental conocida para la especie y la primera para el Sistema Bético, ya que hasta el momento era

la de Aldeahermosa (Sierra Morena Oriental, Prov. Jaén) (DÍAZ-PANIAGUA, 1997, pp. 117-119, in: PLEGUEZUELOS, J. M. (ed.) *Distribución y Biogeografía de los Anfibios y Reptiles de España y Portugal*. Monogr. Herpetol., 3. Univ. Granada-AHE. Granada), situada al otro lado del valle del Guadalquivir, 18 km hacia el oeste. La presencia de tritón ibérico en esta parte del Sistema Bético, justo en el límite oriental del valle del Guadalquivir, puede indicar que alcance incluso la Sierra de Castril en la provincia de Granada, donde esta especie aún no ha sido citada ni se creía posible su presencia.

JOSÉ MANUEL PADIAL¹ & ENRIQUE ÁVILA²

Grupo Naturalista *Signatus*

¹ C/ Ziries 4, 3B. 18005 Granada. España

² C/ Sancho Panza 10, 5B.

18008 Granada. España